



Verificación de Resultados Ecológicos (EOV)

Informe Anual

Estancia Laguna Sofía

Estancia Laguna Sofía sn, Ruta 9 Norte, Puerto Natales PC
6160000, Ultima Esperanza, Chile
Chile



El predio ha demostrado los resultados necesarios para indicar la **regeneración de la tierra** y ha cumplido con los estándares y protocolos de la Verificación de Resultados Ecológicos (EOV).

FECHA DE MONITOREO: Tuesday, March 17, 2026

FECHA DE VERIFICACIÓN: March 24, 2026

Próximo monitoreo a realizarse entre February 17, 2027 y April 17, 2027



Nota: Este informe se aplica únicamente a la evaluación de la salud de la tierra. La verificación exitosa de EOV no permite el uso de declaraciones EOV en productos y/o en el mercado. Por favor, contacte al equipo de Land to Market para consultas sobre afirmaciones de mercado.

INFORME MONITOREO DE CORTO PLAZO

Estancia Laguna Sofía



7,000.00 ha

Complejo Andino Húmedo (Andean humid complex), Chile


Efecto Manada



Monitores

Short Term
Antonia Castro

Resumen de la Verificación de Resultados Ecológicos



La Verificación de Resultados Ecológicos (EOV) es operada por el [Savory Institute](#), una organización sin fines de lucro cuya misión es facilitar la regeneración a gran escala de los pastizales del mundo y los medios de vida de sus habitantes a través del Manejo Holístico. Los Centros Regionales Savory realizan el monitoreo en sus regiones del mundo.

El EOV es un protocolo de recolección de datos empíricos actualmente desplegado en millones de hectáreas en todo el mundo que rastrea resultados en biodiversidad, agua, salud del suelo y función del ecosistema (es decir, ciclo del agua, ciclo de minerales, flujo de energía y dinámica de comunidades). El protocolo fue desarrollado en colaboración con destacados científicos del suelo, ecólogos, agrónomos y una extensa red de gestores de tierras regenerativas en todo el mundo. Se aplica a entornos de pastizales, así como a huertos pastoreados, sistemas silvopastoriles, sistemas mixtos de ganado y cultivos, y áreas mixtas de ganado y bosques.



El Proceso de Monitoreo

Los principales pasos en la EOV incluyen la calibración regional, la creación de un plan de monitoreo, la realización de monitoreo a corto y largo plazo, la revisión de la calidad de los datos y la presentación de datos a los gestores de tierras.

El monitoreo a corto plazo (MCP) se realiza anualmente y el monitoreo a largo plazo (MLP) se realiza cada cinco años. Todos los eventos de monitoreo se realizan durante la temporada de crecimiento. El MCP se centra en indicadores líderes en toda la base de tierras y proporciona la información necesaria para informar ajustes de manejo y verificar las tendencias de salud ecológica. Está diseñado para ser simple, económico y rápido, mientras que sigue siendo científicamente robusto. Los sitios de MLP son sitios de referencia permanentes que evalúan indicadores rezagados para rastrear atributos como carbono del suelo, salud del suelo, infiltración de agua y composición botánica, ya que estos demuestran cambios más lentos y más incrementales.

Para obtener información adicional sobre el proceso, lea el [documento de resumen sobre EOV](#).

Matriz de Evaluación

Code	INDICATOR	Unit	Range	Type	CA	CM	FE	DC
LCA	ABUNDANCIA DEL CANOPEO VIVO	Producción total de biomasa verde / potencial del sitio	-10 to 10	Relativo			✓	
LO	ORGANISMOS VIVOS (MICROFAUNA)	Evidencia de Microfauna	-10 to 10	Absoluto		✓		
FG1	FG 1 ESPECIES PERENNES ESTIVALES	Vigor, reproducción, integridad de la corona	-10 to 10	Relativo				✓
FG2	FG 2 ESPECIES PERENNES INVERNALES	Vigor, reproducción, integridad de la corona	-10 to 10	Relativo				✓
FG3	FG 3 HIERBAS y LEGUMINOSAS	Vigor, reproducción, integridad de la corona	-10 to 10	Relativo				✓
FG4	FG 4 ARBOLES y ARBUSTOS	Vigor, reproducción, integridad de la corona	-10 to 10	Relativo				✓
CDS	ESPECIES RARAS CONTEXTUALMENTE DESEABLES	Frecuencia	0 to 10	Relativo				✓
CUS	ESPECIES CONTEXTUALMENTE INDESEABLES	Frecuencia	-10 to 0	Relativo				✓
LA	ABUNDANCIA DEL MANTILLO	% Cobertura	0 to 10	Relativo	✓	✓		
LI	DESCOMPOSICIÓN DEL MANTILLO	Tipo de mantillo / contacto con el suelo	0 to 10	Absoluto		✓		
DD	DESCOMPOSICION DE LA BOSTA	Tasa de descomposición de bosta	0 to 10	Absoluto		✓		
BS	SUELO DESNUDO	% Suelo desnudo	-20 to 20	Relativo	✓	✓	✓	✓
C	ENCOSTRAMIENTO	Resistencia de la superficie del suelo	-10 to 0	Absoluto	✓			
WIE	EROSIÓN EOLICA	Pedestales activos / deposición	0 to -20	Absoluto	✓			
WAE	EROSIÓN HIDRICA	Riachuelos / corrientes de agua, barrancos	0 to -20	Absoluto	✓			
CA = Ciclo del Agua, CM = Ciclo de los Minerales, FE = Flujo de Energía, DC = Dinamica de Comunidades			-140 to 120					

Nota: La matriz de evaluación anterior incluye los indicadores evaluados durante el monitoreo a corto plazo, así como el rango de puntuaciones para el indicador y los procesos del ecosistema asociados. Por ejemplo, la Abundancia de Dosel Vivo (LCA) se evalúa por la biomasa de material vegetal vivo y puede recibir una puntuación de -10 a 10. Este indicador correlaciona con qué tan efectivo es el proceso de flujo de energía (EF) en ese sitio. Estos 15 indicadores se agregan para crear una puntuación del Índice de Salud Ecológica (EHI) para cada sitio y luego se promedian sobre la superficie para generar un EHI para toda la base de tierras. Los detalles de la matriz de evaluación pueden calibrarse para reflejar las características ecológicas únicas de la ecorregión. Puede referirse a esta tabla al revisar sus puntuaciones STM.

Ecorregión: Complejo Andino Húmedo (Andean humid complex)

This environment is presented as a mosaic of sub-Antarctic forests of Nothofagus, (dominating Lenga and Ñire) on undergrowth and valleys with meadows and semi-deserts in height above the forest line.

It can degenerate into Ñire bush and Patagonian steppe. In the undergrowth can accompany Calafate, sarsaparilla, Mate Verde, Michay of the forest and Colihue.


Guía de Interpretación

INDICADOR	UNIDAD	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
ISP	Puntuación Promedio	< 0	1 - 30	30 - 60	> 60
	INTERPRETACIÓN	Desviación alta a extrema del potencial de la ecorregión. Degradación del suelo activa. Procesos del ecosistema interrumpidos.	Desviación moderada del potencial de la ecorregión. Procesos del ecosistema afectados.	Desviación ligera a moderada del potencial de la ecorregión. La mayoría de los procesos del ecosistema funcionan por encima del 60% del potencial.	Desviación ligera del potencial de la ecorregión. Procesos del ecosistema efectivos. Tierra saludable.
RIQUEZA DE ESPECIES	Número de Especies	< 15	15 - 25	25 - 35	> 35
	INTERPRETACIÓN	Baja biodiversidad	Biodiversidad moderada	Alta biodiversidad	Biodiversidad en plena expresión
ÍNDICE DE SHANNON-WEINER	Índice	< 1.5	1.5 - 2.0	2.0 - 2.5	> 2.5
	INTERPRETACIÓN	La cobertura está dominada por pocas especies	Dominancia moderada de algunas especies	La cobertura se distribuye de manera relativamente uniforme entre las especies	La cobertura está bien distribuida entre las especies
TASA DE INFILTRACIÓN	Minutos/25mm	> 30	10 - 30	3 - 10	< 3
	mm/hora	< 50	50 - 150	150 - 500	> 500
	INTERPRETACIÓN	Tasa de infiltración de moderada a muy lenta	Tasa de infiltración moderadamente rápida	Tasa de infiltración rápida	Tasa de infiltración muy rápida

Resumen Ejecutivo

Por favor, añada un resumen del monitoreo MCP aquí. Si desea que esto se complete automáticamente, por favor agregue notas al evento MCP.

Mapa del Predio



**Sitios
Monitoreo
Corto Plazo**
10

**Sitios
Monitoreo
Largo Plazo**


**Area total del
predio**
7,000.00 ha

**Area
verificable**
6,000.00 ha

Resumen de los Monitores de Corto Plazo

Potrero	Tamaño (ha)	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	EH1
1-Carretero	110.00	-5	0	-	0	0	-5	0	-5	5	10	5	20	0	0	0	25
2-Sofía 1	107.00	-10	5	-	-10	0	5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	15
3-Cuevas	296.00	-10	0	-	-5	-10	-5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	-5
4-Sofía 1	107.00	0	-5	-	0	-5	-10	5	0	10	10	10	20	0	0	0	35
5-Vega 2	90.00	-5	5	-	-5	5	-10	0	0	5	5	5	20	0	0	0	25
6-Limite Margoni	427.00	-5	0	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30
7-Limite Eladio	385.00	-10	5	-	-5	-5	-5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	5
8-Los Corrales	467.00	0	-5	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30
9-Prensa 1	68.60	0	5	-	10	10	-10	10	0	10	10	10	20	0	0	0	75
10-Limite Margoni	427.00	-10	0	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	25
ISP Ponderado: 20.00																	

Análisis de la Función del Ecosistema



STM 1 - Carretero

Lat: -51.542218

Lon: -72.532794

Nombre historico: SOF STM 1

Evaluación forrajera: biomass 600 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 2

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: m

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	-10	0	-	0	0	0	0	-10	5	0	5	20	0	0	0	10
2023	-10	-5	-	0	-10	-5	0	0	5	5	10	20	0	0	0	10
2024	-10	5	-	0	-10	0	0	-5	0	5	10	20	0	0	0	15
2025	-10	-5	-	-5	0	-5	0	-5	5	10	10	20	0	0	0	15
2026	-5	0	-	0	0	-5	0	-5	5	10	5	20	0	0	0	25

STM 2 - Sofía 1

Lat: -51.536745

Lon: -72.561739

Nombre historico: SOF STM 2

Evaluación forrajera: biomass 400 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: i

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	-10	5	-	5	0	0	0	-5	5	0	0	20	0	0	0	20
2023	-10	0	-	-5	-10	0	0	-10	5	5	10	20	0	0	0	5
2024	-10	-5	-	5	5	5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	25
2025	-10	-5	-	-10	-5	5	0	-5	10	5	10	20	0	0	0	15
2026	-10	5	-	-10	0	5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	15

STM 3 - Cuevas

Lat: -51.533278

Lon: -72.56757

Nombre historico: SOF STM 3

Evaluación forrajera: biomass 50 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: i

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	-10	0	-	-5	-10	5	0	-10	5	0	5	20	0	0	0	0
2023	-10	-5	-	-5	-10	-5	0	-10	5	5	10	20	0	0	0	-5
2024	-10	-5	-	-5	-10	-5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	-10
2025	-10	-5	-	-10	-10	-5	0	-10	10	0	10	20	0	0	0	-10
2026	-10	0	-	-5	-10	-5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	-5

STM 4 - Sofía 1

Lat: -51.53618

Lon: -72.57749

Nombre historico: SOF STM 4

Evaluación forrajera: biomass 1400 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 2

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: n

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	5	5	-	10	5	-10	0	-5	0	10	10	20	0	0	0	50
2023	5	5	-	10	5	-10	0	0	0	10	10	20	0	0	0	55
2024	5	0	-	5	0	-10	0	0	0	10	10	20	0	0	0	40
2025	10	5	-	10	-5	0	0	0	10	10	10	20	0	0	0	70
2026	0	-5	-	0	-5	-10	5	0	10	10	10	20	0	0	0	35

STM 5 - Vega 2

Lat: -51.446415

Lon: -72.648566

Nombre historico: SOF STM 5

Evaluación forrajera: biomass 1200 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: m

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	-10	5	-	-5	10	-10	5	0	0	10	10	20	0	0	0	35
2023	-5	5	-	0	10	-10	0	0	5	5	10	20	0	0	0	40
2024	-10	5	-	0	10	-10	0	0	0	10	10	20	0	0	0	35
2025	-10	5	-	-5	0	0	0	0	10	10	10	20	0	0	0	40
2026	-5	5	-	-5	5	-10	0	0	5	5	5	20	0	0	0	25

STM 6 - Limite Margoni

Lat: -51.454287

Lon: -72.648221

Nombre historico: SOF STM 6

Evaluación forrajera: biomass 40 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: s

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	10	5	-	-10	-10	10	0	0	10	10	5	20	0	0	0	50
2023	-10	-5	-	-5	-10	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30
2024	-10	-5	-	-10	-10	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	25
2025	-10	5	-	-10	-10	10	0	0	5	10	10	20	0	0	0	30
2026	-5	0	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30

STM 7 - Limite Eladio

Lat: -51.454458

Lon: -72.680802

Nombre historico: SOF STM 7

Evaluación forrajera: biomass 50 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: s

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	-10	0	-	-5	-10	5	0	-10	5	0	5	10	0	0	0	-10
2023	-10	-5	-	-10	-10	-5	0	-10	0	5	10	10	0	0	0	-25
2024	-10	-5	-	-10	-10	5	5	-10	0	0	10	10	0	0	0	-15
2025	-10	0	-	-5	-10	0	0	-5	5	0	10	20	0	0	0	5
2026	-10	5	-	-5	-5	-5	0	-10	5	5	5	20	0	0	0	5

STM 8 - Los Corrales

Lat: -51.445968

Lon: -72.702699

Nombre historico: SOF STM 8

Evaluación forrajera: biomass 50 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: n

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	10	10	-	-5	-5	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	70
2023	-10	-5	-	-10	-10	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	25
2024	-10	0	-	-10	-5	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	35
2025	-10	10	-	-10	-10	10	0	0	5	10	10	20	0	0	0	35
2026	0	-5	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30

STM 9 - Prensa 1

Lat: -51.539651

Lon: -72.571619

Nombre historico: SOF STM 9

Evaluación forrajera: biomass 1500 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 3

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: m

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	0	5	-	10	5	-5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	65
2023	0	5	-	10	-10	-10	0	0	5	5	10	20	0	0	0	35
2024	5	0	-	10	10	-10	10	0	0	10	10	20	0	0	0	65
2025	5	0	-	5	5	0	5	0	10	10	10	20	0	0	0	70
2026	0	5	-	10	10	-10	10	0	10	10	10	20	0	0	0	75

STM 10 - Limite Margoni

Lat: -51.454588

Lon: -72.665856

Nombre historico: SOF STM 10

Evaluación forrajera: biomass 10 kg DM/ha

Estimación de forraje disponible al momento del monitoreo para asistir en la planificación del pastoreo.

Calidad (pobre 1-5 mejor): 1

Este es un análisis rápido de la calidad del forraje en términos de la nutrición animal. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 representa una calidad pobre y 5 representa la mejor calidad..

Patron de Pastoreo: pg

El patrón de pastoreo ofrece información sobre cómo se están aplicando las herramientas de manejo y cómo está respondiendo la tierra. Se puede describir como una de cuatro clasificaciones: sobrepastoreado (OG), sobre-descansado (OR), descanso parcial (PR), o pastoreo planificado (PG).

Intensidad de uso: s

La cantidad de residuo de forraje y la evidencia del impacto animal se utilizan como una estimación de la intensidad del pastoreo. Esta estimación es importante para evaluar si los periodos de recuperación en el plan de pastoreo son suficientes. La intensidad del pastoreo se describe en una de cuatro clasificaciones: ninguna, ligera, moderada o intensa.

Matriz de Evaluacion: Complejo Andino Humedo

Observaciones:



Año	LCA	LO	FG1	FG2	FG3	FG4	CDS	CUS	LA	LI	DD	BS	C	WIE	WAE	Total ISP
2022	10	5	-	-10	-10	10	0	0	10	10	5	20	0	0	0	50
2023	-10	-5	-	-5	-10	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30
2024	-10	0	-	-10	-10	10	0	0	10	10	10	20	0	0	0	30
2025	-10	5	-	-10	-10	10	0	0	5	10	10	20	0	0	0	30
2026	-10	0	-	-10	-10	5	0	0	10	10	10	20	0	0	0	25